Hemorrhagies de l'urethre

Rapport

n.° 86.

sur quelques observations De Chirurgie par Mr. Ymbert ancien Eleve De L'ecole pratique et Bachelier en Medecinne à Chateau renard.

La premiere en forme De memoire, a pour titre; nouvelle methode D'operer Les tumeurs Enkistées, beaucoup plus sure, et moins Douloureuse que celles que L'on a propposées jusquicy. L'auteur Donne sa preferance à celles Dont L'incision sera faite en V. assurant que nonseulement La cure sera plus courte, mais encore que La cicatrice sera moins Difforme, cequi ne nous paroit pas toujours vrai; car Dans Les petites Loupes De La Grosseur D'une aveline, et même D'une petite noix, on sait que L'incision Longitudinalle est suffisante pour separer les tegumens Du Kiste et celui cy De la partie ou il est attaché: or Le Kiste ôté, Les tegumens se reunissent à la partie Dont ils avoient eté separés par Le Kiste et Les Levres Dela Division, comme une playe simple, et sans aucunne Difformité, ainsi que je L'ai fais et vû faire a mon pere plusieurs fois

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 22 d-1 n°19

Quant aux Loupes, ou tumeurs Enkistées D'une Grosseur mediocre Comme Celle D'un Abricot, on peut Employer La Methode Du S.r Imbert, encore feroit-on bien peut être De preferer L'incision Demi triangulaire, qui Consiste D'abort à faire une incision, sur La partie moyenne et Lateralle Dela tumeur, et Ensuite sur La plus Grande Levre Dela Division, une Legere incision qui permettra De Detacher, et D'oter Le Kiste pour appliquer De nouveau Les tegumens sur La partie Dont ils etoient separés; La reunions Des tegumens se fera alors Comme Celle D'une playe simple. —

Il n'en est pas De même Des Grosses tumeurs Enkistées ou La bonne Methode D'operer est L'incision Cruciale Legere, a ne permettre seulement que La sortie Du Kiste; Comme pour Lors, Les tegumens Distendus, ont trop-D'étendue on peut rafraichir Les angles, et n'en Laisser que Ce qu'il faut pour procurer une Reunion promte, Comme je l'ai vû pratiquer avec succès. a Legard Des autres tumeurs Enkistées Des parties internes Dont il est fait mention Dans Le memoire De M.r Imbert sa methode y est totalement Contraire. Concluons Donc que Cette methode non seulement a peu -

D'avantage, mais même ne merite pas La
preference dans bien des Cas, comme Le pense
son auteur sur toutes Les autres, et qu'elle ne peut
en Consequence trouver place dans Les Memoires de
l'academie ———

La seconde observation de Mr. Imbert a pour
sujet, une hemorragie de L'urethre occasionnée
suivant Lui par L'action du mercure et Guerie par
l'usage de la sonde. nous ne pouvons être de
L'avis de Mr. Imbert sur La Cause de cette
hemorragie, et nous osons presqu'assurer qu'elle
est moins L'effet du Mercure, que celui de la
maladie pour Laquelle il a été employé, ce qui
nous paroit fort aisé à expliquer: La maladie peut
avoir produit un Chancre ou ulcere dans Le
Canal de L'urethre: de ce Chancre ou ulcere il
aura pu en resulter une destruction des tuniques
de quelques Vaisseaux, et par suite necessaire de
cette destruction ou erosion une hemorragie consecutive
sans que Le Mercure y ait contribué en rien. or de
qu'elle utilité pouvoient être dans un tel Cas Les
injections de Differentes especes qu'a employées Le
Sr. Imbert: il a été obligé d'avoir recours à La

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Compression par L'introduction Dela Sonde, et
C'est par où il auroit du Commancer, le moyen
etant Le Seul Convenable pour arreter L'hemorragie.
Cette Derniere observation ne nous paroit pas pouvoir
meriter plus que L'autre De trouver place Dans Les
memoires De L'Academie —

fait a paris le 12 fevrier 1774

Sacathon Delaforest
2.en